

IMUNOCAN D®Vacina Inativada contra *Microsporium canis*

USO VETERINÁRIO

Composição:

Cada dose de 1 ml contém:

Microsporium canis inativado, no mínimo 1 milhão de formas vegetativas

Excipientes: formaldeído (máximo 0,05%) e solução salina fisiológica

Indicações:Prevenção e terapia de dermatomicoses em cães e gatos, induzidas por *Microsporium canis*.**Posologia e modo de usar:**

A dose de 1 ml independentemente da idade, peso e raça do animal. Vacinar filhotes a partir dos 2 meses ou mais, administrando duas doses com intervalo de 10 a 21 dias entre a primeira e a segunda dose. A terceira dose poderá ser aplicada, se necessário, para fins terapêuticos, 10 a 21 dias após a revacinação.

Em cães a aplicação deve ser feita por injeção intramuscular profunda na musculatura da extremidade pélvica e em gatos, por injeção subcutânea ou intramuscular. Nas duas espécies, aplicar a primeira dose no lado esquerdo e a revacinação no lado direito do animal.

Contraindicações e limitações de uso:

Estados febris, e cadelas em gestação não devem ser vacinadas. Outras intervenções imunoproláticas não deverão ser exercidas durante uma semana antes da primeira dose até 14 dias após a segunda (ou terceira, se necessária) vacinação.

Reações adversas:

Pode ocorrer reação local (usualmente do tamanho de uma ervilha) no ponto da injeção que desaparece dentro de 3 semanas. Hipersensibilidade poderá ocorrer em casos excepcionais.

Se for observado qualquer efeito adverso não descrito na bula, o seu veterinário deverá ser avisado.

Precauções:

AGITAR O CONTEÚDO DO FRASCO ANTES DE USAR

Vacinar somente animais sadios e adequadamente nutridos.

Possível tratamento antiparasitário deverá ser administrado 10 dias antes da vacinação. Os animais vacinados não deverão ser submetidos a treinamento ou exercitados por uma semana após vacinação. IMUNOCAN deverá ser usado sempre isoladamente (nunca como diluente de vacinas liofilizadas ou misturada com outras vacinas líquidas).

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.**Responsável Técnico:** Dr. José Felix Daud – CRMV-SP 1631**Prazo de Validade:** 18 meses a partir da data da fabricação.**Apresentação:** Frasco ampola contendo 1 ml, acondicionados em caixas plásticas contendo 2, 10, 20, 50 ou 100 frascos.**Modo de Conservação:** entre 2°C e 8°C, ao abrigo da luz.

Não congelar. Manter fora do alcance de crianças. Não utilizar após prazo de validade.

Partida, Data da Fabricação e Data do Vencimento: ver embalagem.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.727 em 22/03/2013

Proprietário e Fabricante:

Bioveta a.s.

Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané — Czech Republic (República Tcheca)

Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:

Laboratórios Grascon do Brasil Ltda.

Rua Emilio de Souza Docca, 472 - São Paulo SP

04379-024

CNPJ : 03.670.008/0001-53

PRODUTO IMPORTADO

Produzido por Bioveta a.s. como Biocan M Plus