

IMUNOCAN V8®

VACINA CONTRA CINOMOSE (CDV), HEPATITE INFECCIOSA (CAV-1),
LARINGOTRAQUEÍTE INFECCIOSA (CAV-2), PARVOVIROSE (CPV-2),
PARAINFLUENZA (CPIV-2) E LEPTOSPIROSE
(*L.icterohaemorrhagiae*, *L. canicola* e *L.gryppothyphosa*), para cães

USO VETERINÁRIO

Composição:

Fração liofilizada: cada dose contém:

<i>Vírus febris contagiosae canis</i>	min.10 ^{3.0} TCID ₅₀ máx. 10 ^{4.5} TCID ₅₀
<i>Vírus laryngotracheitidis contagiosae canis</i>	min.10 ^{3.5} TCID ₅₀ máx. 10 ^{4.5} TCID ₅₀
<i>Parvovirus enteritidis canis</i>	min. 10 ^{4.5} TCID ₅₀ máx. 10 ^{5.5} TCID ₅₀
<i>Vírus Parainfluenzis canis</i>	min.10 ^{3.0} TCID ₅₀ máx. 10 ^{4.2} TCID ₅₀
Meio de liofilização q.s.p.	1 ml

Fração líquida: cada dose contém:

<i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> inativada	Título mínimo 32 definido por MAT*
<i>Leptospira canicola</i> inativada	Título mínimo 32 definido por MAT*
<i>Leptospira gryppothyphoga</i> inativada	Título mínimo 32 definido por MAT*
Hidróxido de alumínio	2 mg
Veículo q.s.p.	1 ml

*Média geométrica dos títulos de anticorpos específicos definidos por teste de micro aglutinação.

Indicações:

Vacina para imunização ativa de cães contra Cinomose (CDV), Hepatite Infecciosa(CAV-1), Laringotraqueíte Infecciosa (CAV-2), Parvovirose (CPV), Parainfluenza (CPIV-2) e Leptospirose (*Leptospira icterohaemorrhagiae*, *L. canicola* e *L. gryppothyphosa* inativadas)

Posologia e modo de usar:

A dose é de 1ml independentemente da idade, peso e raça do animal.

Cães de 8 semanas ou mais deverão receber duas doses da vacina com intervalo de 14 a 21 dias entre a primeira e a segunda dose. Recomenda-se a revacinação anual. Reconstituir a vacina, adicionando a fração líquida à fração liofilizada e AGITAR O CONTEÚDO DO FRASCO ANTES DE USAR. Após a reconstituição, a vacina deve ser aplicada imediatamente, por injeção subcutânea, preferentemente na região atrás da escápula.

Contraindicações:

Não aplicar em animais em estado febril.

Reações adversas:

Pode ocorrer reação local (usualmente do tamanho de uma ervilha) no ponto da injeção que desaparece dentro de 3 semanas. Hipersensibilidade poderá ocorrer em casos excepcionais.

Precauções:

Embora a vacina seja segura inclusive em cadelas gestantes e lactantes, o uso em animais nessas condições fica a critério do Médico Veterinário.

Vacinar somente animais sadios e adequadamente nutridos. Possível tratamento antiparasitário deverá ser administrado pelo menos 10 dias antes da vacinação. Os animais vacinados não deverão ser submetidos a treinamento ou exercitados por uma semana após a vacinação.

Não utilizar após o prazo de validade.

Venda sob prescrição de Médico Veterinário.

Responsável Técnico:

Dr. José Felix Daud - CRMV-SP 1631

Prazo de validade:

24 meses a partir da data da fabricação.

Apresentação:

Caixas plásticas contendo:

5 doses: 5 frascos contendo a fração liofilizada (antígenos virais), acompanhados de 5 frascos contendo a fração líquida (antígenos Leptospira);

10 doses: 10 frascos contendo a fração liofilizada (antígenos virais), acompanhados de 10 frascos contendo a fração líquida (antígenos Leptospira);

20 doses: 20 frascos contendo a fração liofilizada (antígenos virais), acompanhados de 20 frascos contendo a fração líquida (antígenos Leptospira);

100 doses: 100 frascos contendo a fração liofilizada (antígenos virais), acompanhados de 100 frascos contendo a fração líquida (antígenos Leptospira)

Modo de Conservação:

Em local seco, ao abrigo da luz, entre 2°C e 8 °C. Não congelar.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar após o prazo de validade.

Partida, Data da fabricação e Data do vencimento: ver embalagem

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n ° 10.191 em 03/06/2016

Proprietário e fabricante:

BIOVETA a.s.

Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané —
Czech Republic (República Tcheca)

Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:

Laboratórios Grascon do Brasil Ltda.

Rua Emílio de Souza Docca, 472 - São Paulo - SP

04379-024

CNPJ: 03.670.008/0001-53

PRODUTO IMPORTADO